



Citrol-ina®



Insecticida de contacto.

El aceite más eficaz del mercado.

Capacidad

Composición	Aceite de Parafina 79% p/v (790 g/l)
Formulación	(EC) - Concentrado emulsionable
Nº Registro	15173

CARACTERÍSTICAS

CITROL-INA® es un formulado con alto contenido en complejos parafínicos, lo que le dota de un elevado residuo insulfonable (alrededor del 99%), de óptimo uso por sus propiedades surfactantes en múltiples aplicaciones, pudiéndose aplicar sucesivas veces sin problemas de acumulación ni riesgos de fitotoxicidad.

Por sus características biodegradables, CITROL-INA® es el aceite ideal para su uso conjunto con otros productos de acuerdo a las aplicaciones autorizadas.

PRECAUCIONES

CITROL-INA® es incompatible y por tanto no se puede mezclar con: azufre, captan, algunos acaricidas, antioído, urea, correctores carenciales y dosis fuertes de determinados polvos mojables.

Realizar los tratamientos antes del cambio de color de los frutos y nunca antes de 40 días de haber aplicado un tratamiento con azufre.

No debe tratarse durante la floración.

No debe aplicarse fuera del intervalo 5-35°C.

No aplicar CITROL-INA® cuando se prevean heladas o días calurosos y secos.

En condiciones de deficiencia hídrica regar antes del tratamiento.

Deberán observarse precauciones por la fitotoxicidad del producto para frutales, especialmente los de hueso.

PLAZO DE SEGURIDAD

No procede establecer ningún plazo de seguridad.

Cultivo	Plaga	Dosis	Volumen caldo (L/ha)	Momento aplicación	Nº Aplicaciones (intervalo)
Cítricos	Piojos (<i>Diaspididae</i>) Cochinillas harinosas (<i>Pseudococcidae</i>) Cochinillas (<i>Coccidae</i>) Trips Espumadora (<i>Philaenus spumarius</i>)	1-2 L/hl (a) (10-40 L/ha)	1000-2000(a)	Desde BBCH 69 hasta BBCH 85	1-4 (15 días)
	Mosca de la fruta (<i>Ceratitis capitata</i>) Psila africana (<i>Trioza erytreae</i>) Moscas blancas (<i>Aleyrodidae</i>)	1-1,5 L/hl (b) (10-22,5 L/ha)	1000-1500(b)	Desde BBCH 00 hasta BBCH 69	
	Ácaros Áfidos, Pulgones (<i>Aphididae</i>)	1-1,5 L/hl (b) (10-22,5 L/ha)	1000-1500(b)	Desde BBCH 00 hasta BBCH 69	

Frutales de hueso	Ácaros Espumadora (<i>Philaenus spumarius</i>) Mosca del vinagre de alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)	1 l/hl (a) (10-20 l/ha)	1000-2000(a)	Desde BBCH 69 hasta BBCH 85	1-4 (15 días)
Frutales de pepita	Ácaros Psila del peral (<i>Cacopsylla pyri</i>) Espumadora (<i>Philaenus spumarius</i>)				
Usos menores: cultivos autorizados siguiendo el procedimiento de los usos menores (Art. 51.5 Reglamento (CE) 1107/2009)*					
Almendro	Piojos (<i>Diaspididae</i>) Ácaros Áfidos, Pulgones (<i>Aphididae</i>) Avispilla del almendro (<i>Eurytoma amygdali</i>) Espumadora (<i>Philaenus spumarius</i>) Cochinillas harinosas (<i>Pseudococcidae</i>) Cochinillas (<i>Coccidae</i>)				
Caqui, Granado, Higuera, Kiwi	Piojos (<i>Diaspididae</i>) Ácaros Áfidos, Pulgones (<i>Aphididae</i>) Cochinillas harinosas (<i>Pseudococcidae</i>) Cochinillas (<i>Coccidae</i>)	1 l/hl (a) (10-20 l/ha)	1000-2000(a)	Desde BBCH 69 hasta BBCH 85	1-4 (15 días)
Avellano, Castaño, Árbol de la nuez de macadamia, Nogal, Pacano, nueces de Pecán, Pinos (exclusivamente pino piñonero, piñones aptos para el consumo humano), Pistachero	Piojos (<i>Diaspididae</i>) Ácaros Áfidos, Pulgones (<i>Aphididae</i>) Cochinillas (<i>Coccidae</i>) Cochinillas harinosas (<i>Pseudococcidae</i>) Espumadora (<i>Philaenus spumarius</i>)				
Aguacate, Kumquat	Cochinillas (<i>Coccidae</i>) Cochinillas harinosas (<i>Pseudococcidae</i>) Piojos (<i>Diaspididae</i>)	1-2 l/hl (a) (10-40 l/ha)	1000-2000(a)	Desde BBCH 69 hasta BBCH 85	1-4 (15 días)
		1-1,5 l/hl (b) (10-22,5 l/ha)	1000-1500(b)	Desde BBCH 00 hasta BBCH 69	
	Ácaros Áfidos, Pulgones (<i>Aphididae</i>)	1-1,5 l/hl (b) (10-22,5 l/ha)	1000-1500(b)	Desde BBCH 00 hasta BBCH 69	
Mango	Cochinillas (<i>Coccidae</i>) Cochinillas harinosas (<i>Pseudococcidae</i>) Piojos (<i>Diaspididae</i>)	1 l/hl (a)(b) (10-20 l/ha)	1000-2000(a)(b)	Desde BBCH 69(a) hasta BBCH 85 Desde BBCH 00(b) hasta BBCH 69	1-4 (15 días)
	Ácaros Áfidos, Pulgones (<i>Aphididae</i>)	1 l/hl (b) (10-20 l/ha)	1000-2000(b)	Desde BBCH 00 hasta BBCH 69	

La responsabilidad en relación a la fitotoxicidad y los fallos de eficacia del producto, en estos cultivos, recae sobre la persona que utilice el producto fitosanitario.

(a) Aplicación en verano

(b) Aplicación en invierno.

- BBCH 00: reposo: yemas vegetativas y de inflorescencias indiferenciadas, cerradas y cubiertas de escamas.
- BBCH 69: fin de la floración: han caído todos los pétalos.
- BBCH 85: maduración avanzada.