

- Multisitio, inorgánico sal de Cu.
- Oxicloruro de cobre (expresado en Cu) 50% p/p (500 g/kg).
- Polvo mojable (WP) micronizado.
- 13.138

| CULTIVOS                                                                                                                                                                                                     | PLAGAS, ENFERMEDADES, MALAS HIERBAS                    |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Cítricos                                                                                                                                                                                                     | aguado, bacteriosis, fomopsis y otros hongos endófitos | 0,10%      | 15                  |
| Frutales de hueso                                                                                                                                                                                            | abolladura, bacteriosis, cribado, monilia y moteado    | 0,3-0,4 %  | NP                  |
| Frutales de pepita                                                                                                                                                                                           | bacteriosis, monilia y moteado                         | 0,3-0,4 %  | NP                  |
| Garbanzo                                                                                                                                                                                                     | rabia                                                  | 0,3-0,4 %  | 15                  |
| Granado                                                                                                                                                                                                      | cribado                                                | 0,3-0,4 %  | 15                  |
| Higuera                                                                                                                                                                                                      | podredumbre del fruto                                  | 0,3-0,4 %  | 15                  |
| Olivo                                                                                                                                                                                                        | repilo y tuberculosis                                  | 0,3-0,4 %  | 15                  |
| Ornamentales leñosas                                                                                                                                                                                         | royas y otros hongos endófitos                         | 0,3-0,4 %  | NP                  |
| Patata y lúpulo                                                                                                                                                                                              | mildiu                                                 | 0,3-0,4 %  | 15                  |
| Hortícolas de hoja, brécol y coliflor, ajos, cebolla y chalote, cucurbitáceas de piel comestible y de piel no comestible, tallos jóvenes (excepto espárrago), guisantes verdes, habas verdes y judías verdes | alternaria, antracnosis, bacteriosis y mildiu          | 0,3-0,35 % | 3                   |
| Tomate y berenjena                                                                                                                                                                                           | alternaria, antracnosis, bacteriosis y mildiu          | 0,3-0,4 %  | 3 inver. y 10 campo |
| Vid                                                                                                                                                                                                          | bacteriosis y mildiu                                   | 0,3-0,4 %  | 15                  |

- Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña, a intervalos de 7 días.
- Utilizar un volumen máximo de caldo de 600 L/Ha.
- Utilizar un máximo de 7,5 Kg de Cu/ha y por campaña.

Tratamiento en otoño, pulverizando hasta una altura de 1,5 m.

- Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración.
- Utilizar un volumen máximo de caldo de 1.200 L/Ha.
- Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
- El intervalo de tratamientos será de 14 días.
- Utilizar un máximo de 7,5 Kg de Cu/ha y por campaña.

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



- Efectuar sólo tratamientos desde la cosecha hasta la floración.
- Utilizar un volumen máximo de caldo de 1.200 L/Ha.
- Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña.
- El intervalo de tratamientos será de 14 días.
- Utilizar un máximo de 7,5 Kg de Cu/ha y por campaña.

Aplicar en pulverización normal. (\*) Excepto espárrago.

### OBSERVACIONES GENERALES

- ✓ Aplicar en pulverización normal.
  - ✓ Observar precauciones por la fitotoxicidad propia del cobre, sobre todo en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid y otros cultivos.
- Las recomendaciones e información que les facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos.
- Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.).
- La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.
- ✓ Para cualquier aclaración y para el correcto uso de los productos IQV, deberá c