



Regulador de crecimiento

Capacidad

Fengib

Composición	MCPA (Ester tioetilico) 1% p/v (10 g/l) Ácido Giberélico 0,5% p/v (5 g/l)
Formulación	(EC) - Concentrado emulsionable
Nº Registro	16.394

CARACTERÍSTICAS

Fitorregulador empleado para regular la floración, cuajado, engorde, uniformidad, productividad en el interior del árbol, disminución de la caída y del envejecimiento de la piel de los frutos en cítricos; mejorar el calibre comercial y producción uniforme en todo el árbol sin deformar los frutos en peral, y para mejorar el cuajado de las flores, adelantar la cosecha, incrementar la misma y homogeneizar el tamaño de los frutos en los cultivos de sandía, tomate, berenjena y fresas.

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

Conviene utilizarlo, en general, conjuntamente con **Tonofol®** (corrector de zinc y manganeso), **Magnofol®** (corrector de magnesio) y/o **Liqui-K®** (abono potásico quelatizado). Debe aplicarse sobre sazon de riego o lluvia y no tratar cuando las condiciones atmosféricas sean inestables. Debe mantenerse el nivel nutritivo del campo adecuado a la cosecha que se desea obtener. Los riegos deben ser manejados con corrección, manteniendo un buen nivel hídrico.

Es conveniente su empleo junto con un mojante no iónico, **Elogium®**. Una vez preparado el caldo, deberá ser utilizado dentro de las 24 horas siguientes. Si se produce lluvia dentro de las 6 horas siguientes a la aplicación, es conveniente repetir el tratamiento a los 4-6 días.

Debe pulverizarse completamente el árbol o planta, excepto en el cultivo de tomate, en cuyo caso la aplicación se realizará sólo a los ramilletes florales. Vigilar que el viento no arrastre líquido pulverizado a otros cultivos. No debe ser usado masivamente en ningún caso sin tener un conocimiento exacto de sus efectos; por ello, aconsejamos consultar con nuestros Servicios Técnicos.

No debe emplearse en peral variedad limonera.

En peral variedad Blanquilla, pueden aparecer enrollamientos o abarquillamientos de las hojas que no afectan al normal y completo desarrollo del fruto que, en condiciones ambientales normales, desaparecen luego de un tiempo -temperaturas suaves a bajas y humedades continuadas pueden hacerlas persistir-.

Es un fitorregulador y, como tal, la utilización indebida puede producir efectos distintos a los deseados. Debe prestarse especial atención a las mezclas con productos que contengan sustancias fitorreguladoras. No utilizar en tomate cuando las diferencias de temperaturas entre el día y la noche sean grandes y además la temperatura nocturna esté por debajo de 15°C.

ÉPOCA DE EMPLEO

Según cultivo y variedad: consultar la etiqueta.

Cultivo	Agente	Dosis	Nº Aplic (Intervalo)	Volumen caldo L/ha	Forma y época de aplicación (Condic. específico)	Plazo seguridad (días)
Cítricos (aire libre)	Aumento de cuajado	0.05% - 0.1%	Máx. 4 (min. 60 días)	2000-3600	Máximo 4 aplicaciones realizadas de la siguiente forma: • 1ª aplicación, en floración (BBCH 60-69). Concentración de caldo: 0.05-0.1%. • 2ª aplicación, en frutos de hasta el 40% del tamaño definitivo (BBCH 74). Concentración de caldo: 0.05-0.1%. • 3ª aplicación, desde frutos con el 90% del tamaño final hasta cambio de color (BBCH 79-81). • 4ª aplicación, frutos maduros para su recolección (BBCH 83-89). Concentración de caldo: 0.1%.	5
	Aumento peso del fruto					
	Inhibición caída de frutos					
Peral (aire libre)	Aumento de cuajado	0.075%-0.125%	1	800-1250	Tratando desde el comienzo de apertura de las flores hasta el final de la floración, dependiendo de la variedad (BBCH 60-69).	No procede
	Aumento peso del fruto					
Tomate y Berenjena (aire libre e invernadero)	Aumento de cuajado	0.0201 - 0.09 L/ha	Máx. 2 (10 días)	67 - 180	Tratando a la aparición de las primeras flores hasta 9 o más flores abiertas (BBCH 60-69; solo se tratarán los ramilletes florales)	5 (aire libre) 1 (invernadero)
	Adelanto maduración del cultivo					
	Incremento producción					
	Homogeneización tamaño frutos					
Fresal (aire libre e invernadero)	Aumento de cuajado	0.24-0.6 L/ha	Máx. 3 (10 días)	600-1000	Aplicar en estado de botón verde hasta que las flores estén marchitándose (BBCH 60-69)	5 (aire libre) 1 (invernadero)
	Adelanto maduración del cultivo					
	Incremento producción					
	Homogeneización tamaño frutos					
Sandía	Aumento de cuajado	0.06 - 0.5 L/ha	Máx. 2 (10 días)	200-1000	Tratando a la aparición de las primeras flores hasta 9 o más flores abiertas sobre el tallo principal (BBCH 60-69)	5
	Adelanto maduración del cultivo					
	Incremento producción					
	Homogeneización tamaño frutos					