



DIOXI[®]
NEMATIX

FICHA TÉCNICA

AGROBIOLOGY[®]
CROP NUTRITION

GAMA PROTECTORA



ESPECIFICACIONES

Denominación de tipo:		Solución de abono a base de cobre.	
Nombre comercial:		DIOXI NEMATIX®	
Formulación: Líquido	pH de la formulación: 6,0	Color: Azul claro	Solubilidad en agua: Miscible
Composición percentual: (% en p/p) Cobre (Cu) Soluble en agua 3,0% p/p Cobre (Cu) Quelado 3,0% p/p Agente quelante: EDTA			
Principales compuestos de la formulación: Microelemento Cobre (Cu)			
Descripción: DIOXI NEMATIX® es un corrector de cobre indicado para ser utilizado en cultivos que muestran niveles bajos de este microelemento. En esta particular formulación el cobre está quelatado por EDTA de modo que es asimilado por la planta con la máxima eficacia.			
Categoría de peligro: No aplica	Grupo: Subgrupo E.1.3(f)	Registro: Conforme al Reglamento C.E. 2003/2003	
Recomendaciones: No se puede mezclar con aminoácidos en general, (aminoácidos Dextrógiro y levógiro) péctidos y polipécti- dos, incluidos extractos de algas. No mezclar con aceites minerales de origen químico, productos con contenidos de azufre, altas concentra- ciones de cobre metal, mancozeb, etc.			
Recomendaciones específicas: Leer detenidamente la etiqueta del producto a seguir las indica- ciones de uso.	Presentaciones comerciales: 1000 litros 20 litros 5 litros 1 litro 0,5 litro 0,25 litro		Responsable del producto: Agrobiology Crop Nutrition, S.L.U.

www.foreroagro.com



DIOXI[®] NEMATIX

FICHA TÉCNICA

AGROBIOLOGY[®]
CROP NUTRITION

GAMA PROTECTORA

CULTIVO	DOSIS L/Ha	APLICACIÓN
Algodonero	Por riego: 1 l/ha y aplicación	Aplicar desde plantación
Cereales (arroz, avena, cebada, maíz, maíz palomero, mijo, sorgo y trigo)		
Cítricos (lima, limonero, mandarino, naranjo, toronjo)		Aplicar en primavera y otoño
Crucíferas (brócoli, col o repollo, col de bruselas, coliflor, colinabo, colza y mostaza)		Aplicar desde trasplante, mitad de ciclo
Cucurbitáceas (calabacita, calabaza, chayote, melón, pepino y sandía)		Aplicar desde trasplante, mitad de ciclo, envero
Frutillas (arándano, frambuesa, fresa, grosella y zarzamora)		Aplicar desde brotación, mitad de ciclo, envero, engorde
Frutales de cáscara dura (almendro, nogal, pistacho)		
Frutales de hueso (albaricoque, cerezo, ciruelo, melocotón, nectarina)		Aplicar desde brotación, mitad de ciclo
Frutales pomáceos (manzano, membrillo, peral)		Aplicar desde brotación, mitad de ciclo
Frutales tropicales (aguacatero, café, chirimolla, guayabo, litchi, mango, papayo)		Aplicar desde brotación, mitad de ciclo, envero
Semillas oleaginosas (ajonjolí, canola)		
Solanáceas (chile, tomate, patata, pimiento, acelga, apio, lechuga, perejil)		Aplicar desde trasplante, mitad de ciclo, envero
Hortalizas de inflorescencia (alcachofa)		Aplicar desde trasplante, mitad de ciclo
Hortalizas de raíz (nabo, rábano, remolacha, zanahoria)		Aplicar desde trasplante, mitad de ciclo
Hortalizas de tubérculos y bulbos (ajo, camote, cebolla, patata, yuca)		Aplicar desde trasplante, mitad de ciclo
Leguminosas (chicharro, frijol, garbanzo, lenteja, soya)		
Olivar		
Piña		Aplicar desde plantación, mitad de ciclo
Plátano y banano		Aplicar desde plantación, cada 2 a 3 meses
Vid (una de mesa, vino o uva pasa)		Aplicar desde brotación, mitad de ciclo
Otros (amaranto, espárrago, lúpulo, níspero, granada, caqui, kiwi)		Aplicar desde inicio brotación, floración, engorde

www.foreroagro.com